

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES

CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX SEVRES - VIENNE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

13, ROUTE DE LA FORET BIARD 86 000 POITIERS TEL (49) 58.39.02



Charente - Maritime

BULLETIN N° 1 du 28 Mars 1983

## SITUATION DES CULTURES

Les dates de semis ont été retardées à l'automne à cause des pluies : beaucoup de parcelles sont encore au stade du redressement.

Les maladies du pied sont présentes dans un quart des parcelles avec un niveau d'attaques faibles (de l'ordre de 10 % des pieds touchés).

A l'inverse, septorioses et rouille brune sont importantes et installées dans plus de la moitié des cultures. La douceur de l'hiver laisse prévoir un développement de la rouille jaune.

Les parcelles les plus exposées à ces maladies sont celles qui se trouvent dans les situations suivantes : semis réalisés avant le début novembre.

. terre de groies (où le niveau de maladie est beaucoup plus élevé qu'en terre de champagne).

## LA DECISION DES TRAITEMENTS

tiendra compte des observations en culture :

\* pour les maladies du pied, sachez reconnaître la fusariose, qui ne nécessite pas de traitement (voir planche au verso).

Si plus de 20 % des talles sont attaqués par le piétin verse (ou le rhizoctone) une protection contre cette maladie sera nécessaire au stade 1-2 noeuds. Choisir un produit polyvalent efficace sur septoriose et rouilles.

\* en l'absence de piétin verse, une protection contre les maladies du feuillage est à envisager. La rouille jaune est à combattre dès les premiers foyers. Contre la rouille brune et la septoriose, attendre un développement généralisé de la maladie sur la parcelle.

La note technique blé plus n°4 vous aidera pour choisir les produits. En cas de doute sur l'identification des rouilles, consulter vos techniciens ou le Service de la protection des végétaux.









## AGRICULTEURS STOCKEURS..... VEILLEZ AU GRAIN

L'hiver doux a favorisé les infestations d'insectes des grains. Visitez vos stocks, surtout à leur partie supérieure. Le cas échéant, prenez les mesures nécessaires : transilage, désinsectisation, livraison accélérée puis traitement des cellules.

Imprimé à la Station le 28 Mars 1983

71

# CÉRÉALES : LES MALADIES DU PIED

<p>GAÏNE</p> <p>TIGE</p>	<p>PIÉTIN ÉCHAUDAGE</p>	<p>PIÉTIN VERSE</p>	<p>RHIZOCTONE</p>	<p>FUSARIOSE</p>
<p>AUCUN SYMPTÔME</p>  <p>TACHE EN FIN DE VÉGÉTATION NOIR BRILLANT</p> 	<p>TACHE OCELLÉE BRUNE EN PÉRIPHÉRIE (STROMA)</p>  <p>TACHE OCELLÉE BRUNE EN PÉRIPHÉRIE</p>  <p>STROMA</p>	<p>TACHE BLANC-JAUNÂTRE BORDÉE BRUN</p> 	<p>GAÏNE ECLATÉE BORDÉE DE BRUN</p> 	<p>TACHE DIFFUSE ET STRIÉE</p>  <p>TACHE DIFFUSE ET STRIÉE</p> 
<p>RACINES</p>	<p>DÉSSECHÉES NÉCROSÉES NOIRES</p>	<p>SAINTES</p>	<p>EN PARTIE DÉTRUITES</p>	<p>EN PARTIE DÉTRUITES POURRITURE BRUN CLAIR</p>